

**DRUG**



**INFORMATION**

2010 No. 3

平成22年5月19日発行

処方オーダー時の用法入力は適切な指示をして下さい！

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部  
医薬品情報管理室  
(内線7083)

## 処方オーダー時の用法入力は適切な指示をして下さい！

処方せんの用法記載については、昨年9月に各診療科長等宛に「医師の指示通り」の用法指示時には具体的な用法を記載することとお知らせをしましたが、その後、年度が移ったこともあり、用法不備の処方箋が度々発行されているとの報告を受けています。これについては、院内処方ばかりでなく、院外処方においても認められています。実際、支払基金および国保連合会から指摘を受け査定減になっているとの報告を保険調剤薬局から受けており、そのため、保険調剤薬局からは用法不備の改善を要望されております。また、不明確な用法では患者に対して正確な服薬指導が出来ないため、用法不備の処方箋については、処方箋の度に薬剤部あるいは保険調剤薬局から疑義照会を行っており、結果として問い合わせと疑義照会対応のための労力を費やしております。

このような現状を踏まえ、処方をされる先生方におかれましては、改めて処方オーダー時の用法指示について再認識頂き、次ページ以降に示した具体的な例を参考に適切な用法を指示して頂くようお願い致します。現在、指摘を受けている用法指示の不備は、以下の3点です。

- ①用法が「医師の指示通り」のみで具体的な指示が記載されていないケース
- ②用法が回数の指示のみで服用時期が記載されていないケース
- ③外用薬の投与部位が記載されていないケース

上記の用法指示の不備について、本院の外来院内処方について調査したところ、5月10日(月)～16日(日)の1週間における計310枚の処方せんのうち、用法記載に不備があるものが40枚(12.9%)と多数に認められ、その内訳は、①8枚(2.6%)、②14枚(4.5%)、③18枚(5.8%)でした。同様の処方せん用法記載不備は外来院外処方においても認められております。

本件における事例につきましては、特に外来処方場で問題となっていることから、貴科職員に再度周知徹底頂きますようご協力の程お願い致します。ご不明な点につきましては、薬剤部・医薬品情報管理室（内線7083）までご連絡下さい。

①用法が「医師の指示通り」のみで具体的な指示が記載されていないケース

悪い例

フワブル 処方

投薬歴 DI検索 セット 治験 指定D0 一括指定 オーダー

外来院外処方 通常 薬剤削除 RP削除 全削除 チェック

RP01 ロキソニン錠60mg 1錠

➡ 頓服:10回分, 医師の指示通り 5-18から

RP02

内服頓用あるいは外用薬の指示に多いケースです。具体的な指示の記載がないと、調剤時に正確な服薬指導(いつ服用するのか)ができません。このような用法の場合は、他の具体的な用法を一覧から選択するか、あるいは「医師の指示通り」の選択後、コメント入力で定型コメントを選択するかフリーコメントを入力して下さい。



良い例

フワブル 処方

投薬歴 DI検索 セット 治験 指定D0 一括指定 オーダー

外来院外処方 通常 薬剤削除 RP削除 全削除 チェック

RP01 ロキソニン錠60mg 1錠

➡ 頓服:10回分, 痛い時 5-18から

RP02

## ②用法が回数の指示のみで服用時期が記載されていないケース

悪い例

処方						
投薬歴	DI検索	セット	治験	指定D0	一括指定	オーダー
外来院外処方	通常	薬剤削除	RP削除	全削除	チェック	
RP01	ザンタック錠150mg	2	錠	5-18から14日分		
➡	分2 (1日2回)					
RP02						

内服薬で『用法種別』の「回数指定」を選択した場合に多いケースです。『用法種別』の「回数指定」は1日の服用回数が多い(4回以上)場合に使用する用法であり、1日3回までの服用の場合は『用法種別』の「一般内服」等を使用して必ず服用時期(朝,昼,夕等)や服用タイミング(食後等)を指定して下さい。なお、「回数指定」を選択される場合には必ずコメント等で具体的な指示をして下さい。



良い例

処方						
投薬歴	DI検索	セット	治験	指定D0	一括指定	オーダー
外来院外処方	通常	薬剤削除	RP削除	全削除	チェック	
RP01	ザンタック錠150mg	2	錠	5-18から14日分		
➡	分2 (朝)食後,眠前					
RP02						

### ③外用薬の投与部位が記載されていないケース

悪い例

処方						
投薬歴	DI検索	セット	治験	指定D0	一括指定	オーダー
外来院外処方	通常	薬剤削除	RP削除	全削除	チェック	
RP01	リンデロン-VG軟膏0.12% 10g	3本				
	(塗り薬) 1日1回	5-18から				
	医師の指示通り					
RP02						

外用薬の指示不備のケースです。具体的な投与部位や使用時期の記載がないと、調剤時に正確な服薬指導ができません。外用薬の処方の場合は、必ず投与部位や使用時期等の具体的な指示を記載して下さい。



良い例

処方						
投薬歴	DI検索	セット	治験	指定D0	一括指定	オーダー
外来院外処方	通常	薬剤削除	RP削除	全削除	チェック	
RP01	リンデロン-VG軟膏0.12% 10g	3本				
	(塗り薬) 1日1回, 足	5-18から				
	痒い時に使用					
RP02						