

院外処方せんに記載されている検査値一覧表（基準値：2016年6月1日現在）

| 略号    | 検査項目名                 | 検査項目の説明                                  | 基準値                                  | 単位                        |
|-------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| BUN   | 尿素窒素                  | 腎機能の指標です。                                | 8.0～20.0                             | mg/dL                     |
| CRE   | 血清クレアチニン              | 腎機能の指標です。糸球体濾過量の計算には筋肉量による補正が必要です。       | 男性:0.65～1.07<br>女性:0.46～0.79         | mg/dL                     |
| AST   | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ   | 肝臓、心筋、骨格筋等の障害、溶血の指標です。                   | 13～30                                | U/L                       |
| ALT   | アラニンアミノトランスフェラーゼ      | 肝臓、心筋、骨格筋等の障害の指標です。                      | 男性:10～30<br>女性:7～30                  | U/L                       |
| T-Bil | 総ビリルビン                | 赤血球の分解亢進、肝機能障害、胆道閉塞などの異常を検出します。          | 0.4～1.2                              | mg/dL                     |
| WBC   | 白血球数                  | 感染、膠原病等の炎症性疾患や血液疾患で異常値を示します。             | 3.3～8.6                              | $\times 10^3/\mu\text{L}$ |
| 好中球   | 好中球数                  | 白血球分画のひとつです。感染、膠原病等の炎症性疾患や血液疾患で異常値を示します。 |                                      | $\times 10^3/\mu\text{L}$ |
| HGB   | 血色素量<br>(ヘモグロビン)      | 貧血や多血症の診断・経過観察に用いられます。                   | 男性:13.7～16.8<br>女性:11.6～14.8         | g/dL                      |
| PLT   | 血小板数                  | 出血傾向の鑑別診断・経過観察に用いられます。                   | 158～348                              | $\times 10^3/\mu\text{L}$ |
| INR   | [PT-INR]<br>プロトロンビン時間 | 血液の凝固能に関する指標です。                          |                                      |                           |
| HbA1c | 糖化ヘモグロビン              | 約2ヶ月の血糖値の平均を反映します。血糖コントロールの状態が分かります。     | 男性:4.9～6.5(NGSP)<br>女性:4.9～6.2(NGSP) | %                         |

